

Procédure pour le transport d'un usager sévère avec suspicion ou confirmation de COVID-19 : unité COVID-19 vers les soins intensifs (St-Georges)

GESTION DU CAS À L'UNITÉ COVID-19

- Dans le changement de l'état de santé de l'usager avec une détérioration de l'état respiratoire et une augmentation du besoin en oxygène, l'infirmière avise le médecin responsable;
- Modifier le mode de protection requis pour le personnel en **aériennes/contact renforcées**;
- Si l'infirmière de l'unité COVID-19 n'a pas son fit test de réaliser, il faut appeler aux soins intensifs pour faire venir une infirmière;
- Puisqu'il n'y a pas de pression négative, la porte de la chambre doit rester fermée en tout temps;
- Compléter la feuille de présence du personnel soignant en contact avec l'usager;
- Restreindre au strict minimum le nombre de personnes présentes requis dans la salle;
- Échange entre le médecin responsable et l'intensiviste afin de convenir de l'admission de l'usager aux soins intensifs et envisager le besoin d'intubation;
- Procéder aux interventions en précaution **aériennes/contact renforcées**;
- Avoir du personnel (propre) à l'extérieur de la salle pour établir les communications, fournir le matériel nécessaire, la prise de notes et assurer une vigie sur le revêtement de l'ÉPI et son retrait au moment opportun et sans contamination.

Nettoyage de la chambre :

- Aviser l'équipe d'hygiène et salubrité de la désinfection requise pour la salle.
- Retirer les fournitures et la literie immédiatement après le départ de l'usager.
- Attendre le changement d'air (3.5 heures) avant d'effectuer la désinfection de type **gouttelettes/contact /renforcée** par l'équipe d'hygiène et salubrité. **Important** : le décompte du temps d'attente débute lorsque le retrait des fournitures et de la literie a été effectué. Disposer selon les procédures habituelles en gouttelettes/contact.

TRANSFERT VERS L'UNITÉ DES SOINS INTENSIFS

Préparation :

- Aviser l'assistant ou l'assistante des soins intensifs au poste #36000 du transfert d'un usager sévère avec COVID-19 suspecté ou confirmé;
- Le personnel doit procéder au High Touch lors du déplacement;
- Le personnel attitré aux transferts de l'usager :

Personnel déjà présent dans la chambre d'isolement:

- Dans la chambre, doivent retirer gants et jaquette, procéder au lavage des mains, sortir de la chambre et revêtir à nouveau jaquettes et gants avec du nouveau matériel propre. Ils peuvent conserver le même masque et la protection oculaire déjà en place.

Personnel qui n'était pas présent dans la chambre d'isolement :

- Revêtir l'EPI en précaution aérienne contact.
- Lors du transfert de l'usager, il est important de lui faire porter un masque de procédure et de le recouvrir d'une couverture.

SOINS INTENSIFS

- Préparation de la chambre désignée à pression négative;
- Le personnel attend l'usager avec l'équipement de protection individuelle pour des précautions **aériennes/contact renforcées** (blouse à manches longues, gants, masque N-95, protection oculaire);
- Mise en place de l'affiche de précautions **aériennes/contact renforcées sur la porte**;
- S'assurer que la chambre est bien en **pression négative**;
- Coller la feuille de présence du personnel sur la porte de l'antichambre (faire suivre la feuille débutée à l'urgence);
- Les portes doivent toujours rester fermées;
- Placer des poubelles dans la chambre de l'usager; l'une avec un sac de poubelle, l'autre avec un sac de linge pour la literie souillée;
- Le chariot doit demeurer à l'extérieur de la chambre, et ce, en tout temps. La poche de linge souillé doit être placée dans le chariot qui lui est à l'extérieur de la chambre. L'amener dans l'antichambre (zone propre) seulement lorsque vient le moment de disposer des poches. La poche de linge souillé doit être immédiatement disposée à la chute à déchet;
- Lorsque l'usager est transféré de la civière au lit des soins intensifs, le personnel de l'unité COVID-19 doit désinfecter la civière (avant de sortir de la chambre) avec les linges imbibés d'Oxivir que l'on utilise pour la désinfection des équipements;
- Le personnel de l'unité COVID-19 doit retirer L'ÉPI sans se contaminer dans la chambre avant de retourner à l'unité;
- Le retour à l'étage avec la civière désinfectée se fait selon les procédures habituelles.

***Cette procédure est valide pour les trois (3) quarts de travail. ***

Rédigée par : Comité local COVID-19, hospitalier (Beauce)

Validée par : M^{me} Julie Jacques, conseillère cadre, direction des soins infirmiers
Infirmières en prévention des infections, direction des soins infirmiers

Autorisée par : D^{re} Stéphanie Rodrigue, chef de service médecine interne (Beauce)
M^{me} Nancy Catellier, directrice adjointe des soins infirmiers