

## **Procédure pour le transport d'un usager avec suspicion ou confirmation de COVID – vers unité COVID, soins intensifs ou vers un centre dédié**

### **1- Transfert d'un usager de la psychiatrie vers l'unité COVID-19 de l'hôpital de Thetford**

« Procédure de transport d'un usager non-sévère avec suspicion ou confirmation de COVID-19 : unité de médecine vers l'unité de chirurgie COVID-19 Thetford »

### **2- Transfert d'un usager de la psychiatrie vers les soins intensifs de l'hôpital de Thetford**

« Procédure pour le transport d'un usager qui présente des symptômes sévères avec suspicion ou confirmation de COVID-19 de l'unité COVID-19 vers les soins intensifs »

### **3- Transfert d'un usager de la psychiatrie COVID-19 positif vers la psychiatrie d'un centre désigné (IUSMQ vs HDL)**

« Procédure de transfert COOLSI » + remplir le formulaire de « transfert COOLSI »

- Aviser l'omnipraticien de la demande de transfert et valider les directives médicales requises avant le transfert s'il y a lieu. Possibilité de faire revoir par l'omnipraticien avant de procéder au transfert afin de s'assurer de la stabilité sur le plan médical.
- Discussion entre l'omnipraticien et le psychiatre au besoin
- Le psychiatre contacte le COOLSI pour le transfert
- Organisation du transfert par l'ASI vers le centre désigné
- L'ASI organise le transport par ambulance ou par Dessercom selon besoin de l'usager (\*\*\*)important d'aviser le transport que l'usager est COVID-19 positif)
- Lors de l'arrivée du transport ou de l'ambulance, demander à l'usager de procéder à l'hygiène des mains, faire mettre un masque et revêtir d'une couverture propre
- Les effets de l'usager doivent être placés dans un sac en plastique, fermé et inséré sur l'usager et sous la couverture
- Le personnel impliqué dans le transport doit revêtir l'ÉPI selon le type de précautions additionnelles (gants, masque, jaquette et protection oculaire)
- Aviser l'agent de sécurité du moment du transfert afin de libérer le corridor et réserver l'ascenseur #2. Il doit se tenir à 2 mètres de la civière durant la circulation dans l'hôpital
- Contacter l'équipe d'hygiène et salubrité pour décontaminer le corridor
- NB : L'agent et l'hygiène/salubrité doivent tous deux suivre tout au long du déplacement
- L'agent de sécurité dirigera l'équipe selon la trajectoire de déplacement établie

*Approuvé par le comité local COVID de Thetford.*