

Procédure pour le transport d'un usager sévère avec suspicion ou confirmation de COVID-19 : soins intensifs ou unité COVID à l'étage vers centre désigné (Hôpital de Thetford)

GESTION DU CAS À L'UNITÉ

Médecin traitant ou interniste contacte le COOLSI.

- Organisation du transfert par L'AIC;
- Lors de l'arrivée des ambulanciers, mettre masque, si non intubé, gants et une couverture à l'usager;
- Les effets de l'usager doivent être placés dans un sac en plastique fermé et inséré dans la couverture sur lui;
- Ambulanciers, infirmières et inhalothérapeutes doivent porter le matériel de protection **aériennes/contact renforcées** (blouse imperméable, gants, N-95 et visière);
- Aviser l'agent de sécurité du moment du transfert afin de libérer le corridor et réserver l'ascenseur #2. Il doit se tenir à deux (2) mètres de la civière;
- Contacter l'hygiène et salubrité pour décontaminer le corridor;
- Faire circuler le préhospitalier par le couloir de la morgue;
- L'hygiène et salubrité doit décontaminer le corridor.

***Cette procédure est valide pour les trois (3) quarts de travail. ***

Rédigée par : Lisa Mathieu, coord. clinico-administrative, DASi

Validée par : Comité COVID local de Thetford

Autorisée par : Comité COVID local de Thetford

2020-04-03