

# Transport de l'enfant non sévère COVID-19 de l'urgence vers la Pédiatrie

Secteur Thetford

Gestion du cas à  
l'urgence

- Mettre en place l'affiche précautions gouttelettes/contact protection oculaire
- Masque de procédure à l'utilisateur
- Feuille de présence du personnel
- Nettoyage de la salle par hygiène salubrité



Transfert vers la  
zone jaune/rouge  
COVID-19 en  
pédiatrie

- Aviser l'AIC du CME-PED poste 54040
- Aviser l'agent de sécurité pour qu'il bloque l'ascenseur # 2 et qu'il avise l'hygiène et salubrité suite au passage de l'utilisateur.
- Transfert sur fauteuil ou civière avec le PAB, le brancardier ou infirmière avec mesures de protection gouttelettes/contacts protection oculaire
- Mettre un drap propre sur l'utilisateur, lavage de mains, gants et masque de procédure
- Les effets de l'utilisateur doivent être placés dans un sac de plastique fermé et inséré sous la couverture propre.
- L'accompagnateur doit se laver les mains, porter des gants, jacquette et masque de procédure propre.



Unité COVID-19  
hospitalière  
(Pédiatrie)

- Infirmière de l'utilisateur revêt l'équipement de protection gouttelettes/contact avec protection oculaire
- Le personnel qui a transporté l'utilisateur doit désinfecter le fauteuil ou la civière avant de sortir de la chambre avec Oxivir
- Le personnel retire l'ÉPI selon la procédure avant de sortir de la chambre.



## Critères de sévérité reliés à la COVID-19 chez les enfants :

### Toux ou difficulté respiratoire avec au moins un des symptômes suivants :

- Cyanose centrale ou saturation < 90% à l'air ambiant
- Détresse respiratoire sévère
- Signes de pneumonie avec diminution marquée de l'état général (ex. incapacité de boire, léthargie, perte de conscience, convulsion).