

ISOLEMENT REQUIS | COVID-19

UME/CME-PED

Mis à jour : 2020-04-07

	CAS CONFIRMÉ			CAS SUSPECTÉ		Asymptomatique (normal)
	Avec critères de sévérité ou IMGA	Sans critères de sévérité ou IMGA	Asymptomatique (guéri)	Avec critères de sévérité ou IMGA	Sans critères de sévérité ou IMGA	
Intervention	Le Comité sur les infections nosocomiales du Québec (CINQ) de l'INSPQ recommande une différenciation et une gradation des mesures dans l'application des précautions additionnelles, selon la situation clinique et le diagnostic de l'utilisateur.					
Transfert vers le CHUQ	Si un transfert est requis, le médecin traitant doit contacter le Centre de coordination en périnatalogie du Québec au 1 877 675-4992. Tout cas confirmé requiert actuellement un transfert après son évaluation médicale ou obstétricale.					
Types de précautions additionnelles	<ul style="list-style-type: none"> • Pratiques de base : hygiène des mains. • Gouttelette/contact protection oculaire : blouse jaune jetable ou réutilisable, masque de procédure, gants de nitrile et visière ou lunettes. • Aérienne/contact renforcé : blouse jaune jetable ou réutilisable, masque N95, doubles gants de nitrile, lunettes ou visière. • S'assurer qu'un nombre restreint du personnel intervient dans les chambres COVID-19 positives ou suspectes. 					
Précautions additionnelles requises En général	Aérienne/contact renforcé	Gouttelette/contact protection oculaire	Pratiques de base	Aérienne/contact renforcé	Gouttelette/contact protection oculaire	Pratiques de base

		CAS CONFIRMÉ			CAS SUSPECTÉ		Asymptomatique (normal)
		Avec critères de sévérité ou IMGA	Sans critères de sévérité ou IMGA	Asymptomatique (guéri)	Avec critères de sévérité ou IMGA	Sans critères de sévérité ou IMGA	
OBSTÉTRIQUE	Transfert de la clientèle	Tout cas confirmé doit être transféré, après évaluation de sa condition médicale, obstétricale et du BEF Appliquer les mesures additionnelles en attendant le transfert	Tout cas confirmé doit être transféré, après évaluation de sa condition médicale, obstétricale et du BEF	Pas de transfert	Pas de transfert, sauf si l'état de santé le requiert après évaluation médicale	Pas de transfert sauf si l'état de santé le requiert après évaluation médicale	Pas de transfert
	Triage	Masque de procédure usagère et conjoint + hygiène des mains	Masque de procédure usagère et conjoint + hygiène des mains	Pratiques de base	Masque de procédure usagère et conjoint + hygiène des mains	Masque de procédure usagère et conjoint + hygiène des mains	Pratiques de base
	Observation/évaluation	Aérienne/contact renforcé	Gouttelette/contact protection oculaire	Pratiques de base	Aérienne/contact renforcé	Gouttelette/contact protection oculaire	Pratiques de base
	Hospitalisation autre que l'accouchement	Aérienne/contact renforcé (en attendant le transfert)	Gouttelette/contact protection oculaire (en attendant le transfert)	Pratiques de base	Aérienne/contact renforcé	Gouttelette/contact protection oculaire	Pratiques de base
	Accouchement vaginal	Aérienne/contact renforcé (en attendant le transfert) Blouse bleue imperméable lors de la naissance	Gouttelette/contact protection oculaire (en attendant le transfert) Blouse bleue imperméable lors de la naissance	Pratiques de base	Aérienne/contact renforcé Blouse bleue imperméable lors de la naissance	Gouttelette/contact protection oculaire Blouse bleue imperméable lors de la naissance	Pratiques de base
	Péridurale <i>(les consignes de l'anesthésiste ont préséance sur le tableau)</i>	Aérienne/contact renforcé	Gouttelette/contact protection oculaire	Pratiques de base	Aérienne/contact renforcé	Gouttelette/contact protection oculaire	Pratiques de base
	Césarienne élective	Selon la procédure du bloc	Selon la procédure du bloc	Selon la procédure du bloc	Selon la procédure du bloc	Selon la procédure du bloc	Pratiques de base

		CAS CONFIRMÉ			CAS SUSPECTÉ		Asymptomatique (normal)
		Avec critères de sévérité ou IMGA	Sans critères de sévérité ou IMGA	Asymptomatique (guéri)	Avec critères de sévérité ou IMGA	Sans critères de sévérité ou IMGA	
	Césarienne urgente	Selon la procédure du bloc	Selon la procédure du bloc	Selon la procédure du bloc	Selon la procédure du bloc	Selon la procédure du bloc	Pratiques de base
	Post-partum	Aérienne/contact renforcé (en attendant le transfert)	Gouttelette/contact protection oculaire (en attendant le transfert)	Pratiques de base	Aérienne/contact renforcé	Gouttelette/contact protection oculaire	Pratiques de base
NÉONATOLOGIE	Transfert de la clientèle	Tout bébé avec test positif doit être transféré après évaluation médicale Appliquer les mesures additionnelles en attendant le transfert	Tout bébé avec test positif doit être transféré après évaluation médicale Appliquer les mesures additionnelles en attendant le transfert	Pas de transfert	Pas de transfert, sauf si l'état le requiert	Pas de transfert, sauf si l'état le requiert	Pas de transfert
	Unité néonatale (si besoin de soins intensifs)	Aérienne/contact renforcé (en attendant le transfert)	Gouttelette/contact protection oculaire (en attendant le transfert)	Pratiques de base	Aérienne/contact renforcé	Gouttelette/contact protection oculaire	Pratiques de base
	Chambre privée (si pas besoin de soins intensifs)	Aérienne/contact renforcé (en attendant le transfert)	Gouttelette/contact protection oculaire (en attendant le transfert)	Pratiques de base	Aérienne/contact renforcé	Gouttelette/contact protection oculaire	Pratiques de base
PÉDIATRIE	Transfert de la clientèle	Tout cas confirmé doit être transféré, si l'hospitalisation dépasse 24 heures Appliquer les mesures additionnelles en attendant le transfert	Tout cas confirmé doit être transféré, si l'hospitalisation dépasse 24 heures Appliquer les mesures additionnelles en attendant le transfert	Pas de transfert	Pas de transfert, sauf si l'état le requiert	Pas de transfert, sauf si l'état le requiert	Pas de transfert
	Observation	Aérienne/contact renforcé	Gouttelette/contact protection oculaire	Pratiques de base	Aérienne/contact renforcé	Gouttelette/contact protection oculaire	Pratiques de base
	Hospitalisation	Aérienne/contact renforcé	Gouttelette/contact protection oculaire	Pratiques de base	Aérienne/contact renforcé	Gouttelette/contact protection oculaire	Pratiques de base