

TRAJECTOIRE DE LA FEMME ENCEINTE SE PRÉSENTANT À L'UNITÉ MÈRE-ENFANT(UME)/CENTRE MÈRE-ENFANT (CME)

Utiliser l'outil de triage COVID-19 du MSSS

ÉVALUATION TÉLÉPHONIQUE : QUESTIONNAIRE HABITUEL + TRIAGE COVID-19

VERSION
Thetford
2020-04-09

PRÉTRIAGE # 1 de la femme (et de son accompagnateur) à l'ENTRÉE DE L'HÔPITAL
Par l'agent de sécurité (remise d'un masque, si besoin)

PRÉTRIAGE # 2 de la femme (et de son accompagnateur) à l'UME/CME
Par l'infirmière | Lieu : **269 ou 270**

Femme présentant des symptômes ou cas suspect au COVID-19

- Lui remettre un masque
- Lui demander de se laver les mains

Femme COVID-19 à risque (conjoint suspect et patiente asymptomatique)

- Leur remettre un masque
- Hygiène des mains

Femme sans symptômes et non suspecte au COVID-19

Est-ce que la femme se présente pour une problématique obstétricale? (Voir page suivante)
Appliquer les mesures de pratiques additionnelles selon le tableau

Non

Évaluer et réorienter l'usagère selon le besoin

Oui

OBSERVATION/ÉVALUATION

Chambre privée **269 ou 270**

Accouchement imminent? OU Bien-être fœtal compromis?
Prélèvement pour dépistage COVID-19

Non

Évaluer et réorienter l'usagère selon le besoin

Oui

Prise en charge habituelle

Femme nécessitant une période d'OBSERVATION à l'unité

Chambre # **269 ou 270**

Femme dirigée en obstétrique

Suivre l'algorithme du MSSS afin d'évaluer médicalement si la parturiente doit être transférée ou non.

Salle d'accouchement # **269 si accouchement vaginal et # 270 si césarienne**

CÉSARIENNE (URGENTE OU ÉLECTIVE)

Personnel médical et infirmier limité au minimum requis

Appliquer le protocole en vigueur au bloc opératoire

Aucun accompagnateur au bloc opératoire

Si anticipation de réanimation prolongée ou intubation du nouveau-né : protection aérienne/contact renforcée

1. Évaluation des critères de sévérité COVID-19
2. Aviser le Centre de coordination en périnatalogie du Québec au 1 877 675-4992, si le transfert est requis
3. Aviser le médecin gynécologue ou l'omnipraticien
4. Monitoring fœtal en continu, selon prescription médicale
5. Médecin accoucheur doit aviser l'anesthésiste et le pédiatre de garde (selon installation)
6. Suivre la procédure locale lors d'une péridurale

En salle de naissance

Personnel médical et infirmier limité au minimum requis

Lorsque la *naissance imminente* : aviser le pédiatre de garde/l'omnipraticien

Les masques N95 est nécessaire **seulement** quand la femme (suspect ou confirmé) a des critères pulmonaires de sévérité ou qu'une procédure qui génère des aérosols se produit (consulter le tableau des précautions et les listes de critère de sévérité et IMGA)

Si anticipation de réanimation prolongée ou intubation du nouveau-né : protection aérienne/contact renforcée

Références :

- Documents du CHU de Québec
- Directives pour les femmes enceintes et les nouveau-nés - COVID-19 (version du 27 mars 2020). Consulté le 31 mars 2019 de : <https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/outils-d-information-sur-la-covid-19/>
- Directives pour la prise en charge des enfants 0-17 ans (version du 27 mars 2020). Consulté le 31 mars 2019 de : <https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/outils-d-information-sur-la-covid-19/>
- Particularités d'une intubation endotrachéale chez un patient pédiatrique suspecté ou prouvé Covid-19+ extrait du Guide de procédures techniques SOINS INTENSIFS ET URGENCE SARS-CoV-2 (COVID-19) (version du 26 mars 2020). Consulté le 31 mars 2019 de <https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/directives-cliniques-aux-professionnels-et-au-reseau/urgence/>
- Covid-19 : Mesures de prévention et contrôle des infections pour les milieux de soins aigus : recommandations intérimaires (version du 27 mars 2020). Consulté le 31 mars 2019 de : <https://www.inspq.qc.ca/publications/2906-pci-soins-aigus-covid19>

**Questions à demander à la femme enceinte pour
évaluation des symptômes obstétricaux**

- Motif de la consultation
- Date prévue d'accouchement
- Évaluation de la présence de contractions, de perte de liquide, de sang, diminution des mouvements fœtaux
- Hyperthermie
- Difficulté respiratoire (toux, symptômes de rhume) = masque de procédure